

子どもがかかりやすい病気



子育て中はハラハラドキドキ！ あせらず病院へ！

溶連菌感染症

39度以上の熱が出て、のどが腫れ激しく痛みます。
1～2日たつとかゆみを伴う発疹が出る場合があります。舌にもブツブツが出来て真っ赤になります。

インフルエンザ

高熱、咳やのどの痛み、鼻水、頭痛、筋肉や関節の痛みなど、普通の風邪よりも症状が重いのが特徴です。

水ぼうそう

37～38度くらいの熱が出始めると同時に発疹が出て、やがて水泡になります。2～3日後には乾いてしぼみ、黒いかさぶたになってはがれ落ちます。

とびひ

湿疹、虫刺されなどをかき壊した傷口に細菌が感染して起こります。
強いかゆみを伴い膿が出たり、水泡が出来たりして、水泡の膜が破れると他の部分に広がっていきます。

突発性発疹

38～39度前後の高熱が3～4日続き、熱が下がるとほぼ同時に赤い発疹がおなかに出て、やがて全身に広がります。

はしか

38度前後の熱が出て、2～3日後にいったん下がるものの再び上昇。口の中に小さなポツポツができ、顔や体に赤い発疹が広がります。

風疹

高い熱はあまり出ませんが耳の後ろや首のリンパ節が腫れ、はしかよりも小さく色の薄い発疹が出ます。

おたふく風邪

耳の下からあごが腫れて痛みます。38～39度くらいの熱が出ることもあります。

手足口病

口の中、舌、唇の内側などに赤い斑点が出来、少し遅れて手のひら、足の裏などに白い水泡ができます。

《八雲町感染対策ネットワーク（YIC-Net）》

八雲町感染対策ネットワークでは感染症情報のメール配信サービスを行っています。

登録は touroku@yic-net.com へ空メールを送るだけ！

また、<http://hosp.town.yakumo.hokkaido.jp/modules/yic-blog/>では八雲総合病院スタッフのブログが見られます。

予防のポイントなど最新の情報を子育てにお役立てください。

《北海道小児救急電話相談》

「転んで頭をぶつけた…」どうしよう？「熱が出た…」何℃まで様子を見たらいいのかな？

すぐに医療機関を受診させたほうがいいのか？

お子さんが急な病気やけがで心配なとき、ご相談ください。

小児科医師の支援の下、看護師がご家庭での一般的な対処に関する助言・アドバイスを行います。

☆相談時間：毎日 夜7時から翌朝8時まで

TEL 011-232-1599（いーこきゅうきゅう）

または、#8000（IP電話、ひかり電話からはつながりません。）

詳しくは、北海道保健福祉部ホームページ

<http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/cis/kyukyu/denwasoudan.htm> をご覧ください。